


Användningsområden för PrimärvårdsKvalitet



I korthet

PrimärvårdsKvalitet är:

- Ett evidensbaserat system för lärande, förbättringsarbete och analys av primärvården lokalt, regionalt och nationellt
- Enkelt att använda – automatisk hämtning ur befintliga system
- Utvecklat av primärvårdens professioner

Kontakt

primarvardskvalitet@skr.se



Följ PrimärvårdsKvalitet på Facebook

Mer information

På www.primarvardskvalitet.se finner du:

- Introduktionsmaterial för att börja arbeta med PrimärvårdsKvalitet på VC och rehab
- Arbetsmaterial för att arbeta med olika indikatorområden
- Fördjupning om indikatorerna
- Mer information om det nationella arbetet med PrimärvårdsKvalitet
- Införandestöd för regionerna
- Lärande exempel hur olika VC och regioner arbetar med PrimärvårdsKvalitet

PrimärvårdsKvalitet Psykisk ohälsa

Analys Reflektion Lärande

PrimärvårdsKvalitet är ett nationellt system för kvalitetsdata i primärvården med syfte att stödja förbättringsarbete och uppföljning genom analys, reflektion och lärande.

PrimärvårdsKvalitet utvecklas av primärvårdens professioner och speglar den breda verksamheten av akuta och kroniska tillstånd, psykisk ohälsa, rehabilitering samt kärnområden såsom kontinuitet, samsjuklighet och levnadsvanor.

PrimärvårdsKvalitet innehåller en nationell standard för kvalitetsindikatorer som bygger på evidens och hämtas automatiskt från befintliga datakällor, utan behov av extra registrering. Uppdatering till nationella riktlinjer och ny evidens sker årligen.

Den här foldern innehåller indikatorer för psykisk ohälsa. Mer information www.primarvardskvalitet.se

Ett arbete i samverkan mellan:



SFAM



En del av omställningen till Nära vård

Sammanfattning av indikatorer för psykisk ohälsa

Depression	
Dep1	Förekomst av diagnos depression
Dep2	Andel patienter med nydiagnostiserad depression som blivit somatiskt undersökta
Dep3	Andel patienter med depression som behandlas med antidepressiva läkemedel
Dep4	Andel patienter som har varit på återbesök eller haft annan kontakt efter nyinsjuknande i depression
Dep5	Andel patienter med depression som har varit på återbesök 6–12 månader efter insättning av antidepressiv läkemedelsbehandling
Dep6	Andel patienter som fått psykologisk behandling med Kognitiv beteendeterapi (KBT) vid nydiagnostiserad depression
Dep7	Andel patienter som fått psykologisk behandling med Interpersonell psykoterapi (IPT) vid nydiagnostiserad depression
Dep8	Andel patienter som fått psykologisk behandling med Psykodynamisk terapi (PDT) vid nydiagnostiserad depression
Dep9	Andel patienter med nydiagnostiserad depression som fått psykologisk behandling
Depression/Ångest	
Dep/ Ån1	Andel patienter som behandlas med antidepressiva läkemedel som har fått diagnos depression eller ångest de senaste 24 månaderna

Ångest	
Ån1	Förekomst av diagnos ångest
Ån2	Andel patienter med nydiagnostiserad ångest som blivit somatiskt undersökta
Ån3	Andel patienter med ångest som behandlas med antidepressiva läkemedel
Ån4	Andel patienter som har varit på återbesök eller haft ny kontakt efter nyinsjuknande i ångest
Ån5A	Andel patienter med ångest som har varit på återbesök 6–12 månader efter insättning av antidepressiv läkemedelsbehandling, alla professioner
Ån5L	Andel patienter med ångest som har varit på återbesök 6–12 månader efter insättning av antidepressiv läkemedelsbehandling, läkare
Ån5Ö	Andel patienter med ångest som har varit på återbesök 6–12 månader efter insättning av antidepressiv läkemedelsbehandling, övriga professioner
Ån6	Andel patienter som fått psykologisk behandling med Kognitiv beteendeterapi (KBT) vid nydiagnostiserad ångest
Ån7	Andel patienter med ångest som behandlas med bensodiazepiner
Stressrelaterad ohälsa	
St1	Förekomst av stressrelaterad psykisk ohälsa, på vårdcentral
St2	Förekomst av utmattningssyndrom, på vårdcentral
St11	Förekomst av stressrelaterad psykisk ohälsa, på rehabenhet
St12	Förekomst av utmattningssyndrom, på rehabenhet

ÖVERGRIPANDE INDIKATORER

Kontinuitet	
Ko1	Kontinuitetsindex för personer med kronisk sjukdom
Ko3	Kontinuitetsindex för personer med samsjuklighet
Ko9	Kontinuitetsindex för personer med kronisk sjukdom, alla kontakter under 3 år
Prioritering	
Pr1	Andel patienter som har varit på återbesök vid kronisk sjukdom
Pr3	Andel patienter som fått behandling mot depression vid samsjuklighet
Samsjuklighet	
Ss1	Andel patienter med samsjuklighet
Samverkan	
Sa1	Andel patienter med kronisk sjukdom som har varit på återbesök i primärvård
Sa2	Andel patienter med kronisk sjukdom som inte har varit på återbesök i primärvård eller på sjukhus
Äldre	
Äld3	Andel som behandlas med oxazepam av alla patienter ≥ 75 år som har lugnande läkemedel
Äld4	Andel som behandlas med zopiklon av alla patienter ≥ 75 år som har sömnläkemedel

Läkemedel	
Lm3	Andel patienter som behandlas med bensodiazepinliknande sömnläkemedel
Lm4	Andel patienter med långvarigt bruk av bensodiazepinliknande sömnläkemedel
Lm5	Andel patienter som fått nyförskrivning av bensodiazepinliknande sömnläkemedel ≤ 30 tabletter
Lm6	Andel patienter som behandlas med bensodiazepiner
Lm7	Andel patienter med långvarigt bruk av bensodiazepiner
Lm8	Andel patienter som fått nyförskrivning av bensodiazepiner ≤ 25 tabletter
Lm11	Andel patienter som behandlas med opioider
Lm12	Andel patienter med stor förskrivning av opioider
Lm13	Andel patienter med diagnos alkoholproblematik som behandlats med återfallsförebyggande läkemedel
Demens	
Dem1	Förekomst av diagnos demens, på vårdcentral
Dem2	Andel patienter med demens som behandlas med antipsykotika
Dem3A	Andel patienter med demens som varit på återbesök, alla professioner
Dem3L	Andel patienter med demens som varit på återbesök, läkare
Dem3S	Andel patienter med demens som varit på återbesök, sjuksköterska
Dem3Ö	Andel patienter med demens som varit på återbesök, övriga professioner
Dem4	Andel patienter med Alzheimer demens som behandlas med (eller provat) demensläkemedel
Dem5	Andel patienter med samsjuklighet vid demens
Dem6	Andel patienter med ny diagnos demens som bedömts av arbetsterapeut som del i basal demensutredning, på vårdcentral
Dem7	Andel patienter med ny diagnos demens som fått kognitiva hjälpmedel, på vårdcentral

Levnadsvanor	
Le3	Rådgivning till dagligrökare med kronisk sjukdom
Le4	Rökstopp efter tobaksrådgivning
Le7	Rådgivning/FAR vid kronisk sjukdom och otillräcklig fysisk aktivitet
Le8	Tillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning vid kronisk sjukdom
Le9	Rådgivning vid kronisk sjukdom och riskbruk av alkohol
Le10	Ej längre riskbruk av alkohol efter rådgivning vid kronisk sjukdom och riskbruk av alkohol
Le11	Rådgivning vid kronisk sjukdom och ohälsosamma matvanor
Le12	Ej längre ohälsosamma matvanor efter rådgivning vid kronisk sjukdom

För vissa av levnadsvaneindikatorerna finns det underindikatorer för demens, depression, schizofreni och stress.

KVÅ-koder för psykologisk behandling	
DU008	Systematisk psykologisk behandling, psykodynamisk
DU010	Systematisk psykologisk behandling, kognitiv
DU011	Systematisk psykologisk behandling, kognitiv beteendeterapeutisk
DU022	Systematisk psykologisk behandling, interpersonell
DU023	Psykopedagogisk behandling