


Nationell punktprevalensmätning av trycksår 2021

Exkl. rättspsykiatrisk vård


Andel patienter med trycksår över tid



Totalt 9807 patienter inregistrerade. 1097 plockas bort på grund av att de ej vill delta, annan orsak, patient fanns inom rättspsykiatrisk vård eller att patienten var under 18 år.

* Region Östergötland och Region Stockholm ingår ej i 2021 års mätning

Andel patienter med trycksår per kön och ålder




Av totalt 4234 kvinnor hade 13 procent trycksår och av de 4476 männen hade 14,5 procent trycksår.

* Underlaget grundas på alla regioner exklusive region Stockholm och region Östergötland.

Andel patienter med trycksår kategori 1-4

inkl. ej klassificerbart trycksår och misstänkt djup hudskada



Y Axel: Efter namnet (inom parentes) redovisas nämnaren för andelsberäkningen 2021, N=antal patienter

* Riket grundas på alla regioner exklusive region Stockholm och region Östergötland.

Andel patienter med trycksår kategori 2-4


inkl. ej klassificerbart trycksår och misstänkt djup hudskada

Y Axel: Efter namnet
(inom parentes)
redovisas nämnaren för
andelsberäkningen
2021, N=Antal
patienter

* Riket grundas på alla
regioner exklusive
region Stockholm och
region Östergötland.

Andel patienter med sjukhusförvärvade trycksår kategori 1-4

inkl. ej klassificerbart trycksår och misstänkt djup hudskada




De patienter vars *samtliga* trycksår var dokumenterade i journalen inom 24 timmar räknas bort från de med trycksår. Därför görs beräkningen endast på de patienter som legat inne minst 24 timmar. Måttet kan därför skilja sig en del från andelen med trycksår totalt.

Nämnamnen står inom parentes efter landsting/region
N=Antal patienter som legat inne minst 24 timmar.

* Riket grundas på alla regioner exklusive region Stockholm och Östergötland.

Andel riskpatienter




Riskbedömning enligt Modifierad Nortonskala. Skalan består av sju variabler psykisk status, fysisk aktivitet, rörelseförmåga, födointag, vätskeintag, inkontinens, allmäntillstånd. Riskbedömningen går från 7 poäng (lägst) till 28 (högst). En patient med 20 poäng eller lägre bedöms vara en riskpatient.

Y Axel: Efter namnet (inom parentes) redovisas nämnaren för andelsberäkningen 2021, N=Antal patienter

* Region Stockholm och region Östergötland ingår ej underlaget avseende riskbedömningar 2021.


Andel riskpatienter över tid



Medelåldern för riskpatienter år 2021 är i riket 77 år. Den yngsta riskpatienten var 18 år och den äldsta var 104 år.

* Underlaget grundas på alla regioner exklusive region Stockholm för 2021 och region Östergötland för åren 2019, 2020 och 2021.

Andel riskpatienter med trycksår



Antal riskpatienter som har trycksår delat på totalt antal riskpatienter.

Y Axel: Efter namnet (inom parentes) redovisas nämnaren för andelsberäkningen 2021, N=antal riskpatienter

* Riket grundas på alla regioner exklusive region Stockholm och region Östergötland.